

Consejos de tu farmacéutico



MEDICAMENTOS Y ALCOHOL



¿Qué pasa si durante un tratamiento farmacológico tomo alcohol?



Existen muchas interacciones entre el alcohol y medicamentos. Puede ser que el alcohol aumente o disminuya el efecto del fármaco o que aumenten los efectos tóxicos de ambos.

Consumo ocasional

Pueden producirse efectos tóxicos, porque el tiempo que tarda en eliminarse el fármaco aumenta, por tanto, su efecto es más prolongado en el tiempo.

Consumo habitual

Para conseguir el mismo efecto del medicamento de ciertos fármacos necesitamos dosis más altas, porque hay una pérdida de actividad de los mismos



Consulta el prospecto y a tu farmacéutico



AINES

ANSIOLÍTICOS
ANTIDEPRESIVOS
ANTIPSICÓTICOS
ANTHISTAMÍNICOS

ANTI
DIABÉTICOS
ORALES E
INSULINAS

ANTI
COAGULANTES

METOTREXATO



HEPATO
TOXICIDAD



GASTRO
LESIVO



DEPRESOR
SNC



+
EFECTO
ANTI
COAGULA
NTE



+ EFECTO
HIPOGLUCEMIANTE



+ HEPATO
TOXICIDAD



Daño

¿Hay alguna bebida que provoque más problema?

No es la bebida, es el alcohol: cantidad ingerida, la graduación de la bebida o el tiempo que estés bebiendo.

Antibióticos y alcohol

Aunque no todos los antibióticos interaccionan con el alcohol, puede ocasionar cambios de presión arterial, molestias gástricas, dolor de cabeza, vómitos... o empeorar los efectos adversos de los propios antibióticos.

Cerveza/vino Y Benzodiacepina O Paracetamol

La tiramina puede originar náuseas, vómitos o enrojecimiento facial.

El paracetamol junto al alcohol puede dañar más el hígado.

Ibuprofeno Y alcohol

El ibuprofeno, y otros analgésicos, tomados de forma prolongada pueden dañar el estómago, algo que también puede producir el alcohol. Evita tomarlos juntos.